

tema?

La estigmatización social de las personas infectadas por el VIH sigue siendo un gran problema en España



El **55%** no se sentiría cómodo saliendo con alguien que tuviera VIH



El **47%** cree que las personas con VIH no deberían trabajar en el ámbito sanitario



El **28%** es reacio a trabajar con una persona con VIH



El **35%** cree que las personas con VIH deberían poder desempeñar cualquier trabajo

En España, los niveles de despreocupación respecto a la prevención del VIH son alarmantes

De los encuestados que han tenido nuevas parejas sexuales en el último año:

Usó siempre preservativo **47%**

No usó preservativo **23%**

El **35%**

cree que es posible contraer VIH al compartir un cepillo de dientes

El **60%** cree que el VIH está bajo control en su país

El **83%** cree que la provisión de fondos para la lucha contra el VIH debería ser prioritario para sus gobiernos

A. CRUZ / LA RAZÓN

Curso en el Hospital 12 de Octubre

DR. PEINADO IBARRA

Urólogo/Andrólogo. Director médico del Instituto Láser Medical Rent 900102378



Esta semana se ha celebrado en el Hospital 12 Octubre de Madrid el «1st Madrid International Course» en Disfunción Eréctil dirigido por el prestigioso Dr. Romero, Responsable de una de las Unidades de Referencia en Cirugía Reconstructiva del varón de nuestro país. El Dr. Wilson, una referencia mundial en la cirugía de prótesis de pene y con más de 5.000 cirugías de prótesis de pene realizadas, expuso los beneficios de esta cirugía en el varón que no responde a los tratamientos medicamentosos. En el momento actual, disponemos de fármacos específicos que permiten tener una mejor erección para una relación sexual satisfactoria. El primero fármaco que apareció en el mercado hace ya 20 años fue Viagra y supuso una auténtica revolución del tratamiento de la disfunción eréctil puesto que hasta ese momento, el arsenal terapéutico era muy pobre con resultados mínimos. En el momento actual, disponemos en España de cuatro fármacos orales cuyas propiedades

varían según la duración, efectos secundarios y tiempo de efectividad. Hay también unos fármacos que actúan a nivel local por lo que se administran por el pene mediante su introducción por la uretra. Si los tratamientos medicamentosos fracasan, se pueden utilizar unas inyecciones que se ponen en los cuerpos cavernosos y provocan una erección sin necesidad de estímulo sexual. Estas inyecciones son las que utilizamos al realizar una ecografía doppler del pene para realizar un estudio detallado de la función eréctil. En el curso participaron cirujanos urólogos de renombre mundial como son el Dr. DjinoVIC (Belgrado), Dr. Garaffa (Londres), Dr. Hatzichristodoulo (Wurbzburgo), Dr. Valenzuela (Nueva York) que tuvieron oportunidad de exponer los últimos avances en cirugía de pene. La prótesis de pene es la única solución para los hombres con disfunción eréctil que no responden a ningún tratamiento de los comentados previamente. El índice de satisfacción es muy alto en los pacientes sometidos a esta cirugía puesto que permite recobrar totalmente su vida sexual.

Consúlteme en dr.peinado@lasermedicalrent.com

Consúlteme en

dr.peinado@lasermedicalrent.com

Detecta el

VIH

lo antes posible

No pierdas tiempo.



HVT-2017-0005

autotest VIH®

#tuMOMENTO es AHORA

- Para personas que han estado expuestas a una situación de riesgo, por prácticas sexuales, infecciones de transmisión sexual o de otro tipo (hepatitis, tuberculosis), uso de material punzante compartido con otras personas.
- El test se realizará cuando han transcurrido al menos 3 meses desde que se produjo la práctica de riesgo.
- Consulte con su farmacéutico si tiene dudas.
- De venta exclusiva en farmacias.
- Pida cita con su médico lo antes posible, con el fin de informarle sobre el resultado del test y confirmar el resultado positivo mediante otra prueba de laboratorio estándar.
- Si la prueba de auto-test detecta la infección por VIH, debe adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar transmitir la infección a otras personas.

Mylan
Better Health
for a Better World

Este producto cumple la Directiva sobre Productos Sanitarios de diagnóstico "in vitro" 98/79/CE. CPSP18108CAT